

Durablot™ 10×酪蛋白封闭液 TRIS **10×Casein Blocker TRIS**

Durablot™ 10×酪蛋白封闭液 TBS 含高度纯化的酪蛋白分子以及特有的封闭因子，提供优异的封闭性能，用于饱和封闭印迹膜或其他固相表面，进而降低本底、降低变异系数(CV)，提高检测灵敏度。产品也可用于其他蛋白包被表面的封闭，适用于大多数检测系统。

目录号 Cat no:CABE

包装规格 Package size: 125mL/ 500mL/ 1000mL/ 5000mL，定制更大规格

缓冲液 Buffer: Tris

pH 值 pH value: 7.2±0.2

蛋白质 Protein: casein

保质期 Shelf life: 2 years

储 存 Storage: 2-8°C

应 用 Application:

Western blot: 稀释为 1×工作液后使用，用于封闭印迹膜、稀释抗体、酶标二抗。

用法说明 Instruction:

Durablot™ 10×酪蛋白封闭液 TRIS 为 10×浓缩封闭液，需用 1 份 10× 酪蛋白封闭液 TRIS 加入到 9 份（如 100mL+900mL buffer)纯水中，摇匀后作为 1×酪蛋白封闭液 TRIS 使用。为避免污染，建议现配现用。

Western blot 印迹膜封闭 (示例):

1. 蛋白转印固定；
2. 封闭：加入适量 1×酪蛋白封闭液 TRIS，20-37°C孵育一定时间，通常 15-90 分钟即可；2-8°C过夜封闭可能更佳。
3. 检测：按照实验步骤进行下一步实验。

推荐用 1×酪蛋白封闭液 TRIS 稀释一抗、二抗，本底更佳。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator™ 系列阻断剂:

干扰消除稀释液（无蛋白） | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS

10×干扰消除剂 | 10× Noise Eliminator™

Durastab™ 系列蛋白稳定剂:

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

包被微球稳定剂 | Beads Stabilizer

Durablock™ 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Durastab™ 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

单组份 TMB ELISA 底物

Durastab™ 系列发光底物

AP 微孔发光底物 AMPPD

AP 微孔发光底物 APS-5

HRP 微孔发光底物 Plus

HRP 微孔发光底物 EN

ProCide™ 液体防腐剂

ProCide™ 300 液体防腐剂

ProCide™ 950 液体防腐剂

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物！